

# Butatron<sup>®</sup>

**Tabletas de Fenilbutazona, USP**  
Reg. SAGARPA Q-0513-063

## INDICACIONES

La Fenilbutazona posee actividad antiinflamatoria de gran valor en el manejo de condiciones músculoesqueléticas en perros y caballos tales como artritis, incluyendo osteoartritis, y como ayuda en el alivio de inflamación asociada con el síndrome de disco intervertebral en perros.

## BENEFICIOS

- **Comienzo de actividad inmediato** – Usualmente provee alivio en menos de 24 horas.
- **Comprobado** – Seguro y efectivo
- **Versátil** – Trata condiciones inflamatorias tanto en perros como en caballos
- Aprobado por la FDA y SAGARPA.



## PRESENTACIONES

LIST NO.	PRESENTACIÓN	CANT. x CAJA
1BUT001	1 g x 100 Tbl.	12
1BUT002	100 mg x 1000 Tbl.	12

Ver el reverso para completa información de administración y dosis.

**Bimeda de México S.A. de C.V.**  
Calle Acceso IV #35 Int. "J"  
Zona Industrial Benito Juárez I Querétaro, Qro.  
Tel: (+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332

[www.bimeda.mx](http://www.bimeda.mx)

## **Butatron®**

### **Tabletas de Fenilbutazona, USP**

Reg. SAGARPA Q-0513-063

#### **DESCRIPCIÓN**

La Fenilbutazona es un antiinflamatorio sintético útil en el manejo de condiciones inflamatorias. Es un sólido cristalino, blanco y sin olor, ligeramente soluble en agua y algunos solventes orgánicos.

#### **INDICACIONES**

La Fenilbutazona posee actividad antiinflamatoria de gran valor en el manejo de condiciones músculoesqueléticas en perros y caballos tales como artritis, incluyendo osteoartritis, y como ayuda en el alivio de inflamación asociada con el síndrome de disco intervertebral en perros.

#### **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Perros: administrar oralmente 20mg por .453 kg de peso vivo diariamente en 3 dosis divididas, No exceda los 800mg diarios sin importar el peso vivo.

Caballos: Administrar oralmente 1-2 tabletas por 226 kg de peso vivo, no exceda las 4 tabletas diarias.

#### **CONTRAINDICACIONES**

La Fenilbutazona no debe ser administrado en animales con patología hepática grave, renal o cardíaca, o aquellos con un historial de trastorno sanguíneo.

#### **ADVERTENCIA**

LA FENILBUTAZONE NO DEBE SER ADMINISTRADO A ANIMALES PRODUCTORES DE CARNE, HUEVOS O LECHE, ESTO DEBIDO A QUE EL ESTADO DE RESIDUOS DEL REMANENTE DE LA DROGA EN TEJIDO COMESTIBLE NO HA SIDO DETERMINADO,

#### **PRECAUCIONES Y RIESGOS**

1. Use con especial cuidado en animales con un historial de alergia a drogas.
2. Detenga el suministro de la medicación a la primera señal de molestia gastrointestinal, ictericia o trastorno sanguíneo. Existen casos comprobados de agranulocytosis asociada con la fenilbutazona en humanos. Trastorno sanguíneo inducida por fenilbutazona ha sido reportado en perros. Trombocitopenia y leukopenia son manifestaciones tempranas seguidas por anemia no regenerativa. La aparición de esta reacción no depende de la dosis y es completamente impredecible. Para protegerse de esta posibilidad, lleve a cabo conteos de sangre rutinarios con no más de 7 días de intervalo durante la primera etapa de la terapia y en intervalos de no más de 14 días durante el curso de la terapia. Cualquier caída significativa en el total de glóbulos blancos, disminución relativa en granulocitos o heces de color negra o pegajosas (diarrea) debe ser considerado como señal para el cese inmediato de la terapia e iniciación del tratamiento apropiado
3. Al tratar condiciones inflamatorias asociadas con infecciones, terapia antiinfecciosa será necesaria.

4. La respuesta a terapia con Fenilbutazona es rápida, usualmente ocurre en menos de 24 horas. Si no existe ninguna respuesta clínica significativa al cabo de 5 días de terapia, reevalúe el diagnóstico y régimen terapéutico.

#### **DOSIS – CABALLOS ORALMENTE**

1-2 gramos por 226.5 Kilos de peso corporal, no exceda los 4 gramos diarios.

#### **ADMINISTRACION**

1. Use una dosis relativamente alta para las primeras 48 horas, luego reduzca gradualmente a una dosis fija. Mantenga la dosis mínima capaz de producir la respuesta clínicamente deseada.
2. En algunos casos las tabletas pueden estar molidas y suministradas con comida. Reduzca la dosis si los síntomas disminuyen. En algunos casos el tratamiento debe ser suministrado solo cuando los síntomas aparecen sin la necesidad de medicación continua.
3. En animales, la Fenilbutazona es en su mayoría es metabolizada en 8 horas. Es recomendable que un tercio de la dosis diaria sea administrado en intervalos de 8 horas.
4. Muchas condiciones crónicas pueden llegar a responder al tratamiento con la Fenilbutazona pero al discontinuar el tratamiento los síntomas pueden llegar a reaparecer.

#### **ALMACENAMIENTO:**

Almacene a una temperatura controlada de 20° a 25° C

#### **PRESENTACION**

Butatron® (tabletas de Fenilbutazona, USP) puede ser encontrado en las siguiente presentaciones:

1 g tabletas .....Botellas de 100 tabletas

BUTATRON es una marca registrada de BIMEDA, inc 2006 BIMEDA inc. Todos los derechos reservados. BUT-TS-0106-3000