

# BIMECTIN®

Solución inyectable al 1%  
Ivermectina para uso en bovinos

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

Bimectin® es un endectocida indicado en el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los Bovinos:

- **Gusanos gastrointestinales (adultos y larvas de 4º estadio):** *Ostertagia ostertagi* (incluyendo a larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus columbiformis*, *T. axei*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helveticus* (adulto), *Nematodirus spathiger* (adulto), *Strongyloides papillosus* (adulto), *Trichuris discolor*.
- **Gusanos pulmonares (adultos y larvas de 4º estadio):** *Dictyocaulus viviparus*.
- **Ura:** larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma lineatum*.
- **Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinia bovis*\*
- **Ácaros:** *Psoroptes ovis* (*P. communis* var. *bovis*), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*\*. *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*\*

\* Ivermectina auxilia el control de estos parásitos cuando es utilizada como parte de un programa continuo.

### BENEFICIOS

- **Amplio Espectro:** Es efectivo contra una amplia gama de parásitos externos e internos del ganado bovino. **Comodidad:** Requiere una dosis única y volumen pequeño.
- **Efectivo:** Provoca parálisis y muerte de los parásitos, además de prevenir las re-infestaciones.
- **Empaque seguro:** envasado en un frasco de plástico rígido, que permite sostenerlo con firmeza y previene su rompimiento.
- **Económico:** Bajo costo por dosis. Seguro: Aprobado por la FDA.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Bimectin®



Solución estéril al 1%

Ivermectina inyectable para uso en bovinos

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Bimectin® solución inyectable, es una solución estéril, lista para usarse a base de Ivermectina al 1%.

## FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ivermectina .....	1,00 g
Excipientes c.s.p. ....	100,00 mL

## MECANISMO DE ACCIÓN:

Los endectocidas actúan sobre los receptores GABA de las células del sistema nervioso: bloquean la transmisión del impulso nervioso lo que conduce a la parálisis y muerte del parásito.

## INDICACIONES:

Bimectin® es un endectocida indicado en el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los Bovinos:

- Gusanos gastrointestinales (adultos y larvas de 4º estadio):** *Ostertagia ostertagi* (incluyendo a larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus columbiformis*, *T. axei*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helveticus* (adulto), *Nematodirus spathiger* (adulto), *Strongyloides papillosus* (adulto), *Trichuris discolor*.
- Gusanos pulmonares (adultos y larvas de 4º estadio):** *Dictyocaulus viviparus*.
- Ura:** larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma lineatum*.
- Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinia bovis*\*
- Ácaros:** *Psoroptes ovis* (*P. communis* var. *bovis* ), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*\*.*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*\*

\* Ivermectina auxilia el control de estos parásitos cuando usada como parte de un programa continuo.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Bovinos:** Bimectin® solo se debe aplicar por vía subcutánea, por delante o atrás de la paleta, a una dosis de 200 mcg de ivermectina por kilogramo de peso. Aplicar 1mL de Bimectin® por cada 50 kilogramos de peso.

Peso corporal (kg)	Volumen del producto (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 Kg	4 mL
300 Kg	6 mL
400 Kg	8 mL
500 Kg	10 mL

## TIEMPO DE RETIRO:

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 19 días después de finalizado el tratamiento.
- Este producto no debe aplicarse a hembras productoras de leche para el consumo humano.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- No coma, beba o fume durante la manipulación del producto.
- No contamine corrientes de agua de cualquier naturaleza.
- Desechar los envases vacíos y resto del producto, como también lavar los equipos utilizados de forma segura evitando la contaminación del medio ambiente.
- No apto para uso en humanos.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.
- Consulte a su Médico Veterinario.

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura menor de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

## EFEKTOS COLATERALES POSIBLES:

- Tras la aplicación puede darse hinchazón considerable y dolorosa en el lugar de la inyección. Suele resolverse en pocos días.
- La ivermectina no tiene ningún efecto detectable sobre gestación o reproducción de los bovinos o de animales de compañía.
- En ratones y conejos, son teratogénicos en las mismas concentraciones que causan toxicidad a las hembras preñadas.
- La menor dosis teratogénica en animales de laboratorio sensibles es de 400 µg/kg de peso al día.
- En las dosis recomendadas, BIMECTIN no causa ningún daño a los animales.

## PROPIETARIO Y FABRICANTE:

### BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421  
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408  
[www.bimeda.com.br](http://www.bimeda.com.br)

## INDUSTRIA BRASILEÑA

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**  
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)