

# BIMECTIN 3.5%

Endectocida / Ectoparasiticida

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

- **Bimectin 3.5%** está indicado en bovinos para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas de género *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* (adultos) (eficacia por 23 días), larvas de *Dermatobia hominis*, *Cochliomyia hominivorax* (gusano barrenador del ganado) y nematodos gastrointestinales (*Cooperia punctata*, *C. spatulata*, *C. pectinata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*; *Trichuris discolor* y *Bunostomum phelebotomum*).
- La ivermectina se une a los canales del cloro regulados por glutamato y por el GABA en la membrana celular de las células nerviosas y musculares, las hiperpolariza y causa parálisis y muerte por inanición del parásito.

### BENEFICIOS

- Se puede usar durante la preñez después del cuarto mes de gestación.
- Menor cantidad de tratamientos dentro del año.
- Actúa contra endo y ectoparásitos.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Bimectin 3.5%

Solución inyectable

Endectocida / Ectoparasiticida



## INDICACIONES:

- **Bimectin 3.5%** está indicado en bovinos para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas de género *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* (adultos) (eficacia por 23 días), larvas de *Dermatobia hominis*, *Cochliomyia hominivorax* (gusano barrenador del ganado) y nematodos gastrointestinales (*Cooperia punctata*, *C. spatulata*, *C. pectinata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*; *Trichuris discolor* y *Bunostomum phelebotomum*).
- La ivermectina se une a los canales del cloro regulados por glutamato y por el GABA en la membrana celular de las células nerviosas y musculares, las hiperpolariza y causa parálisis y muerte por inanición del parásito.

## FORMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ivermectina.....	3,50g
Vehículo.....c.s.p.....	100,00 mL

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- La dosis recomendada es de 1mL para cada 50 kg de peso (corresponde a 700 mcg/kg de peso) administrada por vía subcutánea, en la piel suelta en la parte delantera o trasera de la paleta.
- Agitar vigorosamente el frasco antes de la aplicación del producto.
- Utilizar siempre aguja estéril y los procedimientos asépticos se deben seguir durante la aplicación.

## MODO DE USO:

- Bimectin 3.5% debe ser aplicado por vía subcutánea:

PESO CORPORAL (KG)	VOLUMEN (ML)
50 Kg	1 mL
100 Kg	2 mL
200 Kg	4 mL
300 Kg	6 mL
400 Kg	8 mL
500 Kg	10 mL

## CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No aplicar en animales, débiles, agotados, estresados y enfermos.
- No aplicar en animales menores de 4 meses
- No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo del producto.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Mantener el envase del producto cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y del calor a temperatura ambiente (15°C a 30°C).
- Obedecer las indicaciones de las dosis y recomendaciones para el uso del producto.
- Aplicar solamente por vía subcutánea.
- Lavar las manos antes y después de utilizar el producto y no fumar o alimentarse durante el uso del mismo.
- No reutilizar los envases vacíos.
- No contaminar corrientes de agua de cualquier naturaleza.

## REACCIONES ADVERSAS:

La dosis recomendada y bajo la supervisión del médico veterinario no debe provocar envenenamiento en especies a las que está indicado el producto.

## PERIODO DE RETIRO:

### ATENCION: OBEDECER A LOS SIGUIENTES PERIODOS DE RETIRO:

- **Ganado:** El sacrificio de los animales tratados con este producto solo debe ser realizado 109 días después de la última aplicación.
- **Leche:** este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para el consumo humano.

## PRESENTACIÓN

Frascos de 50 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.

## PROPIETARIO Y FABRICANTE:

### BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Conego Cyriaco S. Pires, nº421 Monte Mor /SP – CEP 13193-580  
CNPJ 00.328.741/0001-04 SAC 0800 555408

### INDUSTRIA BRASILEÑA

### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**  
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)