

ENROMED®

Enrofloxacina 10%

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Enromed® Inyectable es un antibacteriano de amplio espectro indicado para bovinos y porcinos, en el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, de pezuñas y mastitis.

BENEFICIOS

- **Amplio espectro de acción:** Actua contra bacterias Gram (+), Gram (-), espiroquetas y Mycoplasma.
- Rápida recuperación del animal.
- **Enromed®** cuenta con muy buena difusión, acción y eficacia.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



INTRODUCCIÓN:

La enrofloxacina es una quinolona de segunda generación, también conocida como fluoroquinolona.

Enromed® es un potente bactericida que actúa contra infecciones causadas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, espiroquetas, y Mycoplasma en bovinos y porcinos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Enromed® es una solución antimicrobiana de amplio espectro, formulada a base de enrofloxacina.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Enrofloxacina (clorhidrato) 10.00 g
Excipientes c.s.p 100.00 mL

INDICACIONES:

Enromed® Inyectable está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones:

- **Bovinos:** en enteritis por: *Escherichia coli*, *Salmonella dublin*. Neuromonas por: *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella multocida*. Mastitis por: *Escherichia coli*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus*. Pododermatitis por: *Fusobacterium necrophorum*. Cistitis por: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.
- **Porcinos:** en enteritis por: *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella enteritidis*. Neumonas por: *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Síndrome MMA (mastitis, metritis y agalaxia): *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.
- Indicado en tratamientos post-quirúrgicos como castraciones, descornes, laparotomías y lesiones accidentales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- **Enromed®** debe ser aplicado por vía intramuscular en las dosis: **Bovinos y Porcinos:** Aplicar 1 mL de Enromed® por cada 40 kg de peso vivo, diariamente durante 3 a 5 días.
- En infecciones respiratorias complicadas, aplicar 1 mL de Enromed® para cada 20 kg de peso vivo diariamente, durante 5 días.
- Cuando el volumen a inyectar sea superior a 10 mL, se aconseja dividirlo en dos o más puntos de aplicación.

PERÍODO DE RETIRO:

- **Bovinos:** Los bovinos tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta **8** días después de finalizado el tratamiento. La **leche** producida durante el tratamiento y hasta **5** días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.
- **Porcinos:** Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **6** días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Observar los cuidados normales de asepsia para inyecciones en animales.
- No guardar o aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos de uso humano, productos de higiene y domésticos.
- El producto no debe ser administrado en animales sensibles al principio activo.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperatura menor de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN:

Frasco de vidrio ámbar conteniendo 50 y 100 mL.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y ADMINISTRAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10
Zona Pradera Torre II, Nivel 15
Of. 1512 Guatemala

