

LONTAL POUR ON®

(Triclorfon)

Bernicida, larvicia y mosquicida sistémico para bovinos

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Lontal Pour On está indicado para el tratamiento y control de las infestaciones causadas por larvas de *Dermatobia Hominis* (*nuche/ura*), *miasis* (*gusanera*) causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax* y de la infestación por mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) en bovinos.

BENEFICIOS

- Fácil aplicación en un solo punto
- Acción sistémica (limina las larvas en todo el cuerpo del animal)
- Listo para usar
- Efectivo en todas las etapas de la larva.
- Producto coloreado (evita la doble aplicación).



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Lontal Pour On ®

(Triclorfon)

BERNICIDA, LARVICIDA Y MOSQUICIDA SISTEMICO PARA BOVINOS

USO VETERINARIO



FORMULA:

Cada 100ml contienen:

Triclorfon.....30.00 g
Excipientes c.s.p100.00 mL

INDICACIONES:

Lontal Pour On está indicado para el tratamiento y control de las infestaciones causadas por larvas de *Dermatobia Hominis (nuche/ura)*, *miasis (gusanera)* causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax* y de la infestación por mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) en bovinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Lontal Pour On debe ser aplicado en un único lugar sobre la piel en la región lumbar en una dosis de 1 mL por cada 10 kg de peso (30 mg de triclorfon / kg de peso), dosis máxima 40 mL.

TABLA DE DOSIS

Peso del Animal	Dosis en mL
50 kg	05 mL
100 kg	10 mL
200 Kg	20 mL
300 Kg	30 mL
400 Kg	40 mL

Presionar el frasco para que el producto pase al dosificador en la cantidad correcta para el peso de cada animal.

CONTRAINDICACIONES:

- No hay contraindicaciones para el producto, siempre que sea usado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, inserto.
- De preferencia no tratar hembras en el final de la preñez debido al estrés que se causa.

PRECAUCIONES:

- De preferencia no aplicar el producto en animales cansados, comiendo ración o sometidos a ayuno prolongado.
- No utilizar simultáneamente con otros organofosforados (anticolinesterásicos). No aplicar en días lluviosos y en animales mojados.
- No aplicar el producto simultáneamente con medicamentos arsenicales, fenotiazinicos o depresores del SNC.
- Mantener el envase cerrado. Obedecer a las dosis y recomendaciones para uso del producto. Producto tóxico para peces, aves y abejas.
- Evite el contacto prolongado con la piel, mucosas y la inhalación del producto. Lavar las manos después de manipular el producto y no fumar o comer durante la manipulación del producto.
- No guardar junto a los alimentos, bebidas, medicamentos, artículos de higiene personal o del hogar.
- No almacenar en casas de habitación.
- Lavarse bien las manos y la parte expuesta del cuerpo antes de comer y de beber, después de trabajar con el producto.

- No reutilizar los envases vacíos.
- Destruya el envase después de uso del producto. No contaminar ríos y otros cursos de agua.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua, durante 15 minutos.
- Si ocurre intoxicación accidental proceder de la siguiente forma: retirar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas del cuerpo con agua y jabón.
- En caso de ingerir accidentalmente, no provocar vomito y no proporcionar grasas de la leche o aceites al paciente.
- Procurar inmediatamente ver al médico llevando consigo la etiqueta e inserto del producto.
- No diluir el producto en aceites.

PERIODO DE RETIRO:

OBEDECER A LOS SIGUIENTES PERIODOS DE RETIRO: BOVINOS: 02 DÍAS DESPUÉS DE LA ULTIMA APLICACIÓN. LECHE: 02 DÍAS DESPUÉS DE LA ULTIMA APLICACIÓN.

PRESENTACIÓN:

Frasco plástico dosificador de 1L.

Conserve los envases cerrados, en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente (15°C - 30°C) protegidos

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10
Zona Pradera Torre II, Nivel 15
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt