

# MEGACAL-M

## SOLUCIÓN INYECTABLE

### Calcio, Magnesio y Fósforo

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

Para el tratamiento en bovinos en las siguientes condiciones:

- Paresia por hipocalcemia antes, durante y después del parto.
- En síndrome de vaca caída o fiebre de leche (incluso durante la preñez) causada por enfermedad o disfunción de la secreción interna.
- Tetania por hipofosfatemia o hipomagnesemia.

### BENEFICIOS

- Restaura los niveles de calcio en sangre en caso de hipocalcemia e incrementa los niveles de Magnesio.
- Baja cantidad de aplicación para corregir la deficiencia.
- Cero tiempo de retiro en leche.
- Alta concentración de calcio para administración intravenosa y subcutánea.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Megacal-M

## Solución Inyectable

### Calcio, Magnesio y Fósforo



#### INTRODUCCIÓN:

Solución inyectable de calcio, fósforo y magnesio de uso parenteral indicado en bovinos para el tratamiento de hipocalcemia o fiebre de leche ocasionada por una marcada disminución del calcio sérico en vacas durante el periparto.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Solución inyectable, estéril, amarillo pálido.
- Para el tratamiento de hipocalcemia y aumentar los niveles de Magnesio en sangre.

#### FÓRMULA:

Calcio .....	4.06 g/100 mL
	Equivalente a 55.42 g de Borogluconato de calcio
Fósforo .....	2.0 g
Magnesio .....	0.8 g
	Equivalente a 8.6 g de Hipofosfato de magnesio
Excipientes c.s.p. ....	100 mL

#### INDICACIONES:

Para el tratamiento en bovinos en las siguientes condiciones:

- Paresia por hipocalcemia antes, durante y después del parto.
- En síndrome de vaca caída o fiebre de leche (incluso durante la preñez) causada por enfermedad o disfunción de la secreción interna.
- Tetania por hipofosfatemia o hipomagnesemia.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Administre por inyección subcutánea o intravenosa lenta.
- Se sugiere una dosis de 100-200 ml por animal. Sin embargo, la dosis administrada dependerá de las condiciones del animal, y la cantidad a utilizar se deja a criterio del Médico Veterinario.

#### PERIODO DE RETIRO:

0 horas de tiempo de retiro en leche y carne.

#### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

- La solución deberá ser calentada a temperatura corporal antes de usar.
- Evite su uso en casos conocidos de hipersensibilidad a los ingredientes y en casos conocidos de arritmia cardíaca o toxemia severa.

#### PRECAUCIONES:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Para tratamiento animal únicamente.
- Este producto no contiene preservativos. Deseche el restante trás su uso.
- Si algún aparente crecimiento o decoloración ocurre el producto deberá ser desecharado.

#### PRESENTACIONES:

Frasco de vidrio por 100 mL.

#### ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura menor de 30°C.  
Protéjase de la luz solar directa.

#### PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BVP para Bimeda Brasil, S.A.  
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421  
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408  
[www.bimeda.com.br](http://www.bimeda.com.br)  
INDUSTRIA BRASILEÑA

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**  
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)