

# OPTICINA® 10%

ENROFLOXACINA  
ANTIBIÓTICO

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

Opticina® para tratamiento y control de infecciones causadas por órganos Gram+ y Gram- y Mycoplasmas sensibles a antibióticos. Antibacteriano de amplio espectro.

- **En cerdos:** *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *E.coli* y *Pasteurella multocida*.
- **Perros y Gatos:** *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydophila felis*, *Mycoplasma spp*, *Brucella canis*, *Bartonella spp*.
- **Aves:** *E. coli*, *Haemophilus araghinalinarum*, *pasteurella multocida*, *Mycoplasma*, *Salmonella*.

Indicado para el tratamiento de diversas infecciones bacterianas:

- Infecciones respiratorias y digestivas.
- Infecciones posparto
- Infecciones de pezuñas
- Mastitis

### BENEFICIOS

- Rápida recuperación del animal.
- Relación costo-beneficio muy positiva



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Opticina® 10%

Enrofloxacina  
Antibiótico



## FÓRMULA:

Cada 100 mL del producto contiene:

Enrofloxacina base ..... 10,00 g  
Excipiente ..... c.s.p. ..... 100,00 mL

## INDICACIONES DE USO:

**Opticina®** para tratamiento y control de infecciones causadas por órganos Gram+ y Gram- y Mycoplasmas sensibles a antibióticos. Antibacteriano de amplio espectro.

- **En cerdos:** *Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, E.coli y Pasteurella multocida.*
- **Perros y Gatos:** *Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis, Mycoplasma spp, Brucella canis, Bartonella spp.*
- **Aves:** *E. coli, Haemophilus aragallinarum, pasteurella multocida, Mycoplasma, Salmonella.*

Indicado para el tratamiento de diversas infecciones bacterianas:

- Infecciones respiratorias y digestivas.
- Infecciones posparto
- Infecciones de pezuñas
- Mastitis

## VIA DE APLICACIÓN:

- Administración por vía oral.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

- **Perros y Gatos:** 2 gotas por kg de peso. Administrada directamente a la boca del animal.
- **Aves:** Solución oral para administrarse en el agua de bebida.
- **Dosis:** 0.5 mL por litro de agua de bebida, es equivalente a 10 mg de principio activo por cada kg de peso. La dosis, se puede incrementar de acuerdo con el criterio de médico veterinario.
- Se recomienda mantener el tratamiento por un mínimo de tres días para evitar la formación de cepas resistentes.
- Debe diluir 0.5 mL de Opticina en un litro de agua o 100 mL en 200 litros de agua de bebida. Durante 3 días. Para tratamiento de Salmonella mantenga el tratamiento por 5 días.

## CONTRAINDICACIONES:

La enrofloxacina está contraindicada en perros de razas pequeñas a medianas entre los 2 y los 8 meses de edad, en pacientes con desórdenes convulsivantes, y/o hipersensibles a las fluoroquinolonas.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- No se recomienda el uso del producto en vías parenterales no aprobadas y puede conducir al desarrollo de importantes efectos adversos.
- La dilución y el uso extrarrótulo en pequeños animales de productos para grandes animales a través de cualquier vía no es recomendada.
- Prevenir la deshidratación del animal durante el tratamiento.
- Los pacientes con grave deterioro de la función renal o hepática pueden requerir un ajuste de la dosis para evitar la acumulación de la droga.

## PRECAUCIONES GENERALES:

- Conservar el producto en sus empaques originales cerrados.
- Almacenar a temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

## TIEMPO DE RETIRO:

**LAS AVES TRATADAS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 8 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.**

## ESPECIES:

- Aves, Cerdos, Perros y Gatos

## PRESENTACIÓN:

- Caja con 10 frascos gotero de 10 mL

## FABRICADO POR:

**BIOFARM QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.**

**Para: Propietario: BIMEDA BRASIL, S.A.**

Rod. Conego Cyriaco S. Pires, nº421 Monte Mor /SP – CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04 SAC 0800 555408

## INDUSTRIA BRASILEÑA

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)