

TRIGENTAL

Antibiótico Oral en Pasta

FICHA
TÉCNICA



INDICACIONES

Trigental para el tratamiento de:

- **Terneros:** diarrea causada por *Salmonella dublin*, *Salmonella enteritidis* y *Escherichia coli*.
- **Porcinos:** diarrea causada *Salmonella choleraesuis* y *Escherichia coli*.

BENEFICIOS

- Dosificación oral.
- Fácil aplicación por medio de jeringa dosificadora
- Actúa rápidamente en el sitio de la infección
- Cura la diarrea de tipo bacteriana del ternero rápidamente.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Trigental

Antibiótico Oral en Pasta



INTRODUCCIÓN:

Trigental es un antidiarreico en pasta de uso oral a base de enrofloxacin, un potente agente antimicrobiano para tratamiento de las enteritis bacterianas, principalmente la diarrea de los terneros y lechones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- La enrofloxacin es un antibiótico bactericida, de la clase de las fluoroquinolonas.
- La actividad bactericida de la enrofloxacin es dependiente de la concentración, con la muerte de bacterias sensibles ocurriendo dentro de 20-30 minutos de exposición. Se ha demostrado un efecto post-antibiótico significativo para bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.
- Después de la administración por vía oral, las fluoroquinolonas son rápidamente absorbidas por animales monogástricos y pre-rumiantes y el pico máximo de concentración sérica varía según la especie animal.

FÓRMULA:

Cada 100 g de Trigental contienen:

Enrofloxacin5,00 g
Excipiente c.s.p100,00 g

INDICACIONES:

Trigental para el tratamiento de:

- **Terneros:** diarrea causada por *Salmonella dublin*, *Salmonella enteritidis* y *Escherichia coli*.
- **Porcinos:** diarrea causada *Salmonella choleraesuis* y *Escherichia coli*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Suministrar por vía oral, directamente sobre la lengua de los animales así:
- **Bovinos:** 5 gramos de TRIGENTAL para 100 kg de peso, lo que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacin por kg de peso.
- **Porcinos:** 5 gramos de TRIGENTAL para 100 kg de peso, lo que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacin por kg de peso.
- Estas dosis deben ser administradas cada 24 horas o a criterio del Veterinario.
- No interrumpir el tratamiento hasta por lo menos, 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

TIEMPO DE RETIRO:

Los **bovinos** tratados **NO** deben sacrificarse para consumo humano hasta **04** días después de finalizado el tratamiento.

Los **porcinos** tratados **NO** deben sacrificarse para consumo humano hasta **07** días después de finalizado el tratamiento.

Este producto **NO** debe aplicarse a hembras productoras de **leche** para el consumo humano.

CONTRAINDICACIONES:

- El producto no debe ser aplicado en animales sensibles al principio activo.
- Puede ocurrir urticaria y prurito en animales hipersensibles a las quinolonas.
- No usar en animales en gestación, lactación e Insuficiencia renal grave.

PRECAUCIONES:

- No administrar el producto al mismo tiempo con medicamentos conteniendo: magnesio, calcio, hierro y zinc, pues estos reducen la absorción de las quinolonas.
- No utilizar el producto al mismo tiempo con alcalinizantes urinarios (bicarbonato de sodio, citratos o inhibidores de la anhidrasa carbónica) pues pueden causar nefrotoxicidad, a pesar de ser rara.
- Antagonismo con Tetraciclinas y Sulfas + Trimetoprim.

- **No apto para uso en humanos.**
- **Manténgase fuera del alcance de los niños.**
- **Consulte a su Médico Veterinario.**

PERÍODO DE VIGENCIA:

02 (dos) años a partir de la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN:

Jeringa dosificadora de 40 g.

Debe estar en periodo de vigencia.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421

Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10

Zona Pradera Torre II, Nivel 15

Of. 1512 Guatemala

BIMEDA COLOMBIA S.A.S.

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt