

# Univit B12 1000®

VITAMINA B12 1000 mcg/mL

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

**Univit B12 1000®** Para tratamiento con B12 en casos de mala absorción de B12 como ileostomía, gastrectomía o síndrome de deficiencia y mala absorción. Anemias producidas por enfermedades infecciosas, y en estados de convalecencia, animales débiles y lactantes.

### BENEFICIOS

- Produce energía a través del metabolismo, también va a favorecer la producción de las células de todo el organismo, lo que es muy importante para disminuir el dolor neuropático.
- Se puede usar en animales convalecientes, débiles, lactantes y en entrenamiento.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# Univit B12 1000®

VITAMINA B12 1000 mcg/mL

(Cianocobalamina)

Solución Inyectable

ANTIANEMICO



## FÓRMULA:

Cada mL contienen:

Vitamina B12 ..... 1000 mcg  
(Cianocobalamina)

Excipientes c.s.p.

## INDICACIONES

Para tratamiento con B12 en casos de mala absorción de B12 como ileostomía, gastrectomía o síndrome de deficiencia y mala absorción. Anemias producidas por enfermedades infecciosas, y en estados de convalecencia, animales débiles y lactantes.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

- Bovinos y equinos:** 5 a 10 mL una vez por semana.
- Becerro y potros:** 2 a 4 mL una vez por semana.
- Porcinos:** 2 a 5 mL una vez por semana.
- Caninos y felinos:** 0.5 a 1 mL una vez por semana.
- Gallos:** 0.5 mL antes y después de ser sometidos a esfuerzo físico.

## ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, potros, porcinos, caninos, felinos, equinos, becerros y gallos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular

## CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:

- Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Lea el inserto antes de utilizar el producto.

## REACCIONES ADVERSAS:

No hay toxicidades significativas asociadas con el tratamiento.

## INTERACCIONES:

La administración crónica de cimetidina también puede dar lugar a deficiencia de B12 ya que se necesita un ambiente ácido para que ocurra la absorción de B12.

## PERÍODO DE VALIDEZ:

02 (dos) años después de la fecha de fabricación. Después de la primera perforación de la tapa el producto puede ser utilizado por hasta 180 días.

## PRESENTACIÓN:

Frascos de 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

## PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A. Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421  
Monte Mor/SP - CEP 13193-580 CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408

## INDUSTRIA BRASILEÑA

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Bimeda (G), S.A**  
Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10  
Zona Pradera Torre II, Nivel 15  
Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)