

# CRECIBOL®

Undecilenato de boldenona

## FICHA TÉCNICA



### INDICACIONES

Crecibol® esteroide y anabólico de baja actividad androgénica.

- Ejerce en el organismo un mejor balance nutricional que permite un mejor aprovechamiento de la energía, formando masa muscular y fomentando el crecimiento.
- Coadyuvante para la síntesis proteica en casos de estres, fracturas, perdida de peso y otras enfermedades.
- Efecto prolongado de hasta 4 semanas.

### BENEFICIOS

- Aumenta la ganancia de peso,
- La síntesis de proteínas,
- Aumenta el apetito y
- Estimula la liberación de eritropoyetina en los riñones.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



## INTRODUCCIÓN

Esteroides anabólicos de acción prolongada, presentación inyectable en un vial ámbar; el principio activo se encuentra disuelto en un vehículo oleoso. Se presenta en concentración de 50 mg por mililitro.

En presencia de calorías y proteínas adecuadas, los esteroides anabólicos promueven el proceso de construcción de tejidos y pueden revertir el catabolismo. Debido a que estos agentes son derivados o están íntimamente relacionados con la testosterona, poseen varios grados de efectos androgénicos. La liberación de testosterona endógena puede ser suprimida por inhibición de hormona luteinizante. Dosis altas pueden impedir la espermatogénesis por retroalimentación inhibitoria negativa de la Hormona Folículo estimulante FSH.

Los esteroides anabólicos también pueden estimular la eritropoyesis. El mecanismo por el cual ocurre este efecto es por activación del factor estimulante eritropoyético. Los anabólicos pueden causar retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósforo; así como disminuir la excreción urinaria de calcio.

**Farmacocinética:** No hay información específica para este agente. Se considera como un anabolico de acción prolongada, con efectos que duran por más de 8 semanas. Se desconoce si los agentes anabólicos se presentan en la leche materna. La absorción prolongada después de la administración parenteral (IM) ocurre con las preparaciones de ácidos grasos de cadena más larga, como los ésteres de decanoato y undecilenato, que necesitan hasta 4 semanas para que ocurra la absorción completa a partir de los sitios de inyección. El tiempo de excreción para los esteroides anabólicos de acción más corta en general es de aproximadamente 10 a 14 días.

**Toxicidad:** Aunque no se ha reportado en caballo, los esteroides anabólicos tienen el potencial de provocar toxicidad hepática.

## INDICACIONES

El Undecilenato de boldenona se utiliza como terapia adjunta. Como una ayuda para el tratamiento de caballos débiles cuando se desea mejora en peso, pelaje o condición física general.

Se indica para:

- Fomento del crecimiento.
- Debilidad después de enfermedad o cirugía; Distrofia muscular.
- Anemia, especialmente la aplásica.
- Insuficiencia renal (aumento del apetito y vigor, ganancia de peso, hematocrito, concentración de hemoglobina, recuento de eritrocitos).
- Trastornos hepáticos.

En bovinos, equinos, ovinos y caprinos, porcinos y caninos como agente anabólico.

Coadyuvante para promover la síntesis proteica en casos de estrés, fracturas, pérdida de peso y enfermedades de tipo consumtivo.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

### Crecibol® 50 mg / mL:

#### Porcinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos:

- 25 mg / 45 kg de peso vivo o 0.5 mL / 45 kg de peso vivo.
- Repetir cada 4 semanas

#### Perros:

- 12.5 mg / 5k g de peso vivo o 0.25 mL / 5 kg de peso vivo
- Repetir cada 2 semanas.

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)

## TIEMPO DE RETIRO

- **Carne:** Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.
- **Leche:** no administrar en animales productores de leche para consumo humano.

## PRECAUCIONES

Son de categoría "X" en el embarazo y son contraindicados a causa de posible masculinización del feto. (el riesgo en su uso sobrepasa cualquier beneficio). Cuando se administra un esteroide anabólico a un animal, es importante cerciorarse de la ingestión adecuada de proteínas, calorías, vitaminas (especialmente piridoxina, folato e hidroxocobalamina), hierro y cobre. Las respuestas hemáticas benéficas pueden no ponerse en evidencia hasta varias semanas después de haberse iniciado el curso terapéutico. Debe evitarse la suspensión brusca de los esteroides anabólicos.

## CONTRAINDICACIONES

Boldenona produce un efecto perjudicial en el tamaño de los testículos, en la producción y calidad de espermatozoides en sementales. En las yeguas, ovarios pequeños, incremento del tamaño del clítoris, duración del estro reducida, reducción en la taza de embarazo y alteración severa de la conducta sexual. Los siguientes efectos adversos se han presentado con el uso de esteroides anabólicos:

- Efectos androgénicos con aumento de la libido en machos y comportamiento sexual anormal en hembras.
- Adenocarcinoma hepático (raro).
- Fiebre esteroide debida a la formación de metabolitos esteroides pirógenos. Exacerbación de la hipertrofia prostática o de carcinomas.
- Cierre de placas epifisarias causando detención del crecimiento.
- Disminución de la resistencia ósea.
- Reducción de la fuerza de tensión de los tendones
- Teratogenicidad del comportamiento con alteración de los equilibrios endocrinos en años posteriores.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.  
Protéjase de la luz solar directa.

## PRESENTACIÓN

Crecibol 50 mg / mL Fco. Amp. X 250 mL vt y 50 mL.

## Vía de administración:

Intramuscular profunda.

## TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

[www.bimeda.gt](http://www.bimeda.gt)